



**DPC**

**Questionnaire à nous retourner impérativement**

*Plusieurs réponses sont possibles.*

*Cochez les cases correspondant à votre réponse.*

**Journée SOP du 19 juin 2014 : « Les implants à l'épreuve du temps »**

**Question 1.**

Quel type de muqueuse est le plus favorable pour la bonne santé et stabilité des tissus péri-implantaires ?

- A. la muqueuse alvéolaire
- B. la muqueuse attachée kératinisée

**Question 2.**

Quel type de fixation pour la prothèse implantaire est le plus risqué sur le plan biologique ?

- A. la prothèse scellée
- B. la prothèse vissée

**Question 3.**

La péri-implantite est ...

- A. strictement une pathologie de l'interface os-implant
- B. une pathologie inflammatoire d'origine infectieuse
- C. une pathologie dépendante de l'hôte
- D. strictement liée au type d'implant utilisé

**Question 4.**

Cocher la ou les affirmations vraies :

- A. il est essentiel de sonder autour des implants pour diagnostiquer les péri-implantites
- B. les facteurs de risques parodontaux ne s'appliquent pas aux péri-implantites
- C. les tissus péri-implantaires présentent des réactions inflammatoires plus agressives que les tissus parodontaux
- D. les traitements des péri-implantites sont voués à l'échec

**Question 5.**

Les études concernant la prévalence des péri-implantites indiquent un pourcentage de patients atteints de péri-implantites parmi les porteurs d'implants compris entre :

- A. 0 et 10% des patients porteurs d'implants
- B. 10 et 30% des patients porteurs d'implants
- C. plus de 50% des patients porteur d'implants

**Question 6.**

Le diagnostic différentiel entre les mucosites péri-implantaires et les péri-implantites se fait :

- A. par l'observation visuelle des tissus péri-implantaires
- B. par la profondeur du sondage péri-implantaire
- C. par le niveau osseux radiographique péri-implantaire

**Question 7.**

Les traitements non-chirurgicaux des péri-implantites permettent :

- A. de réduire le saignement au sondage
- B. de réduire la profondeur de poche
- C. de réparer l'os détruit

**Question 8.**

Pour réparer l'os détruit par une péri-implantite, il faut utiliser une membrane en présence :

- A. d'un défaut osseux à quatre murs
- B. d'un défaut osseux à trois ou deux murs
- C. d'une perte osseuse horizontale

**Question 9.**

La responsabilité implique toujours l'ensemble des praticiens qui sont intervenus dans le traitement implantaire :

- A. vrai
- B. faux

**Question 10.**

Le praticien réalisant la prothèse peut-il modifier son projet prothétique sans l'accord du praticien ayant placé les implants :

- A. oui
- B. non

*Merci de nous retourner ce document de préférence par mail, sinon par courrier.*

*Date limite de renvoi : Qcm ANTE : 17 juin 2014 - Qcm POST : 27 juin 2014*

Questionnaire ANTE formation

Questionnaire POST formation

Nom :

Prénom :

Adresse :

CP :

Adresse mail : \_\_\_\_\_ @ \_\_\_\_\_

(En caractères lisibles)

N° RPPS (11#) : \_\_\_\_\_ N° ADELI (9#) : \_\_\_\_\_

(Numéros RPPS et/ou ADELI utilisés lors de la création de votre compte DPC sur le site OGDPC: [mondpc.fr](http://mondpc.fr))