



DPC

Questionnaire à nous retourner impérativement

Plusieurs réponses sont possibles.

Cochez les cases correspondant à votre réponse.

Journée SOP du 18 juin 2015 « Prescrire juste : mode d'emploi »

Question n°1 :

La codéine et le tramadol sont :

- a. des morphiniques faibles
- b. des morphiniques forts
- c. des non morphiniques

Question n°2 :

En cas de douleurs faibles que prescrire ?

- a. du paracétamol dosé à 500 mg
- b. des A.I.N.S.
- c. du paracétamol dosé à 1 g

Question n°3 :

Le paracétamol n'est pas contre- indiqué :

- a. chez la femme enceinte
- b. chez un patient sous A.V.K.
- c. chez un patient sous antiagrégant plaquettaire

Question n°4 :

L'indication d'une antibiothérapie est recommandée :

- a. en cas d'alvéolite sèche
- b. en cas de stomatites bactériennes
- c. en cas de sinusite odontogène bactérienne

Question n°5 :

L'indication d'une antibiothérapie est recommandée :

- a. en cas d'avulsion d'une dent de sagesse mandibulaire
- b. en chirurgie pré-implantaire
- c. en chirurgie parodontale (poches mucogingivales)

Question n°6 :

Dans les cardiopathies à haut risque (groupe A) certains gestes sont contre-indiqués ?

- a. l'anesthésie régionale
- b. les amputations radiculaires
- c. la chirurgie pré-implantaire

Question n°7 :

L'antibiothérapie curative en 1^{ère} intention est une :

- a. antibiothérapie documentée (documentation bactériologique)
- b. monothérapie
- c. antibiothérapie probabiliste

Question n°8 :

L'association colchicine (Colchimax®) et josacine (Josamycine®) est :

- a. contre-indiquée
- b. recommandée

Question n°9 :

L'association d'un A.V.K. et du Bactrim® entraîne :

- a. une potentialisation de l'A.V.K.
- b. ne modifie pas l'action de l'A.V.K.

Question n°10 :

Dans le cas de patient atteint de cancer ou de polyarthrite rhumatoïde, la prise en association du méthotrèxate et de l'amoxicilline est :

- a. contre-indiquée
- b. déconseillée

Question n°11 :

Chez l'immunodéprimé, l'association d'une ciclosporine (Néoral® par ex) et de la clarithromycine (Zeclar®) est :

- a. déconseillée
- b. contre-indiquée

Question n°12 :

Les A.I.N.S. ont une activité antalgique :

- a. supérieure au paracétamol
- b. inférieure au paracétamol
- c. égale au paracétamol
- d. égale à l'association tramadol + paracétamol

Question n°13 :

L'association paracétamol et A.I.N.S. a une activité antalgique :

- a. supérieure aux 2 molécules prises séparément
- b. sera prescrite le plus souvent en 2^{ème} intention

Merci de nous retourner ce document de préférence par mail, sinon par courrier à la SOP.

Dates limites de renvoi : Qcm ANTE : mardi 16 juin - Qcm POST : vendredi 26 juin 2015

Questionnaire ANTE formation

Questionnaire POST formation

Nom :

Prénom :

Adresse :

Code Postale : _ _ _ _ _ Ville :

Adresse mail : _ _ _ _ _ @ _ _ _ _ _
(En caractères lisibles)

N° RPPS (11 chiffres) : _ _ _ _ _ N°ADELI (9 chiffres) : _ _ _ _ _
(Numéros RPPS et/ou ADELI utilisés lors de la création de votre compte DPC sur le site OGDPC: mondpc.fr)