



**DPC session 12631600001 S1**

**Réponses au Questionnaire cochées, en gras et en jaunes**

**Journée SOP du 13 octobre 2016 « L'étanchéité coronaire, clé de la pérennité de la dent »**

**Question n°1 :**

Avant d'entreprendre un traitement endodontique, il est nécessaire de cureter les tissus carieux et de retirer les anciens matériaux de restauration coronaire.

- a. vrai
- b. faux

**Question n°2 :**

Avant de poser le champ opératoire (digue), il est nécessaire de restaurer les parois coronaires manquantes de façon transitoire.

- a. vrai
- b. faux

**Question n°3 :**

Lorsqu'une interséance est nécessaire, le matériau de choix pour obturer la cavité d'accès est :

- a. le Cavit
- b. l'IRM
- c. le Cavit recouvert d'un CVI

**Question n°4 :**

Après un traitement endodontique il est préférable :

- a. de laisser la cavité d'accès ouverte
- b. de différer la restauration coronaire à une séance ultérieure
- c. de restaurer la dent dans la séance

**Question n°5 :**

Pour la dent dévitalisée, dans quel cas de figure choisira-t-on une restauration collée indirecte plutôt que directe ?

- a. quand on n'est pas sûr de son traitement endodontique
- b. quand on a perdu au moins une paroi
- c. dans tous les cas de figure

**Question n°6 :**

Après la dépose d'une ancienne couronne et le retraitement endodontique, si je veux temporiser 6 mois, il vaut mieux :

- a. que je temporise avec une reconstitution corono-radulaire (Inlay-Core, RMIPP) et une dent provisoire bien adaptée
- b. que je temporise avec une dent provisoire à tenon bien adaptée

**Question n°7 :**

L'assemblage d'un Inlay-Core nécessite :

- a. la désinfection du logement canalaire à l'hypochlorite de sodium
- b. la pose d'un champ opératoire et la désinfection du logement canalaire à l'hypochlorite de sodium
- c. aucun de ces deux actes

**Question n°8 :**

Dans le cas d'une dent nécessitant un retraitement endodontique, et présentant une perte de substance sous gingivale, il est préférable de réaliser d'abord :

- a. l'élongation coronaire (ou la remontée de marge) puis la reconstitution de la perte de substance avant de la retraiter endodontiquement
- b. retraiter la dent, avant de faire l'élongation (ou la remontée de marge) puis la restauration de la perte de substance

**Question n°9 :**

Pour coller sur la dentine d'une dent traitée endodontiquement il faut utiliser :

- a. un système avec mordantage préalable (M&R, ou total-etch)
- b. un adhésif auto-mordant (SAM, ou Self-etch)
- c. n'importe quel adhésif